

Sjekkliste: Fysiologisk homeostase for mottak av pasienter med mistanke om hjerneslag/TIA

NB! Dokumentet skal skannes

Parametere	0. døgn	1. døgn	2. døgn	Kommentar
Blodtrykk og puls ved ankomst og x 4 første døgn	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Behandlingsmål: Infarkt BT < 220/120, > 140/90 Blødning tilstrebe BT < 180/100
Blodsukker x 2 første døgn. Ved hyperglykemi x 4.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			Ved blodsukker > 8 mmol/l, kontakt lege. Ved hyperglykemi gis insullin sc inntil glucosenivå er < 8-10 mmol/l. Hyppigere målinger ved diabetes eller avvik.
Temperatur	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ankomst: Før kl 14: Temp. ved ankomst + x 2 Etter kl 14: Temp. v/ankomst + x 1
Væske intravenøst 1-2 liter første døgn	<input type="checkbox"/>			Ikke glukose første 24 timer. OBS: Hjertesvikt.
Oksygen	<input type="checkbox"/>			Gi gradert O2 ved SaO2 < 95 % med mål om metning 97-99 %.